

GRUPO A4
CRUSTACICIDA

Clartex

X-tra

CEBO GRANULADO PARA EL CONTROL DE BICHO BOLITA

COMPOSICIÓN:

Acetamiprid: (E)-N[(6-cloro-3-piridil) metil]-N2-ciano-N1-metilacetamida	1,6 gr
Inertes	100 gr

"LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

SENASA N° 39.251

N° de partido: Ver Envase Fecha de Vencimiento: Ver Envase

ORIGEN: FRANCIA

CONTENIDO NETO: **20 Kg**

NO INFLAMABLE

EMPRESA REGISTRANTE:
DE SANGOSSE LATIN AMERICA S.A.
Lima 369 10° H (1073) Buenos Aires, Argentina
Tel.: +54 (11) 5217 4278

RESPONSABILIDAD LEGAL:

DE SANGOSSE LATIN AMERICA S.A. se responsabiliza por la composición del producto hasta la fecha de su vencimiento. La empresa no se hace responsable del uso, aplicación y almacenamiento del producto, pues está fuera de su control. No se responsabiliza por accidentes de cualquier índole que pudieran producirse.

PRECAUCIONES:

- I. MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- II. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- III. INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- IV. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.
- V. EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- VI. PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES:

Evitar su inhalación y el contacto con la piel y los alimentos. Usar guantes, gafas y máscara facial, botas de goma y ropa protectora adecuada para su aplicación. No emplear sin previo lavado, ropa que haya tenido contacto con el producto en tratamientos anteriores. Finalizado el tratamiento, lavarse con agua y jabón, todas las partes del cuerpo expuestas al producto.

RIESGOS AMBIENTALES:

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico

Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico

TRATAMIENTO DE REMANENTES:

Todos los remanentes deben ser recolectados para su destrucción, de modo tal que ofrezcan la máxima garantía para la salud humana y el ambiente.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: una vez limpios los envases vacíos eliminarlos en un incinerador aprobado para químicos o recurrir a un servicio especializado en residuos de plaguicidas y envases vacíos.

ALMACENAMIENTO: almacenar en un sitio cubierto, seco y en estibas pequeñas, separadas del piso, en su envase original cerrado. No transportar ni almacenar con alimentos o ropas.

DERRAMES: En caso de producirse derrame barra y recoja con una pala el material vertido y deposite en un recipiente el cual deberá ser etiquetado inmediatamente, el mismo deberá ser enviado a una empresa habilitada para su destrucción. Posteriormente lavar el área afectada con abundante agua.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llevar a la persona afectada a un lugar ventilado, llamar a un médico o trasladarla a un servicio de emergencia, llevando el envase o la etiqueta del producto. Quien realice los primeros auxilios debe evitar tomar contacto directo con el material. **Intoxicación por ingestión:** lavar la boca con agua, NO provocar vómitos. No dar a beber leche ni alcohol. **Nunca administrar nada por boca, ni inducir el vómito a una persona inconsciente.** SOLICITAR ASISTENCIA MÉDICA. **Intoxicación por Inhalación:** colocar al accidentado al aire libre y en reposo; dar calor, SOLICITAR ASISTENCIA MÉDICA. Si fuese necesario, proveer respiración artificial. **Si hubiera contacto con los ojos,** lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar a un médico. **En caso de contacto con la piel,** quitar la ropa y zapatos contaminados y lavar la zona afectada con abundante agua y jabón durante 15 minutos. **EN TODOS LOS CASOS, LLAMAR AL MÉDICO EN FORMA INMEDIATA.**

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO: PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO CLASE IV.

IRRITACIÓN OCULAR: LEVE IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA IV.

AVISO PARA EL MÉDICO:

NO TIENE ANTÍDOTO ESPECÍFICO. APLICAR TRATAMIENTO SINTOMÁTICO.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES:

TODO EL PAÍS: T.A.S. Centro de consultas toxicológicas (Rosario). 0800-888-TOXICO (8694)

Capital Federal: Hospital de Clínicas José de San Martín Tel.: 5950-8806/8804. Hospital Pedro Elizalde Tel.: 4300-2115 y 4307-5842. Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Tel.: 4962-2247 / 6666. **Provincia de Buenos Aires:** Policlínico Posadas Tel.: 4658-7777 / 3001 y 4654-6648. Hospital de Niños de La Plata Tel.: (0221) 451-5555. **Provincia de Córdoba:** Hospital de Niños Tel.: (0351) 445303, Hospital de Urgencias Tel.: (0351) 427-6200. **Provincia de Santa Fe:** T.A.S. Centro de consultas toxicológicas (Rosario). Tel.: (0341) 448-0077 / 424-2727. Servicio de toxicología. Sanatorio de niños, Rosario. Tel.: (0341) 448-0202 (24 hs). **Provincia de Chaco:** Hospital Dr. Julio C Ferrando (Resistencia). Tel.: (03722) 42-5050/7233. **Provincia de Mendoza:** TOXICAID Centro de información toxicológica - ECI Emergencias médicas. Tel.: (0261) 425-0248 / 423-1123. Hospital Central. Tel.: (0261) 449-0500. Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico Mendoza. Tel.: (0261) 428-2020 (24 hs). **Provincia de Neuquén:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 443- 2727 / 449-0800. **Provincia de Tucumán:** Hospital Centro del Niño Jesús: (0381)424-7141. Asistencia Pública y Emergencia Médica. Tel.: (0381) 430-5449 Int-26. (La VdeSa 14 hs). **Provincia de Salta:** Hospital del Niño, Servicio de Toxicología. Tel.: (0387) 421-3954 (Int. 115) / 431 -0277. **Provincia de Jujuy:** Sección Toxicología, Hospital de Niños Dr. Héctor Quintana. Tel.: (0388) 423-0144.

GENERALIDADES:

CLARTEX X-TRA es un cebo granulado de última generación especialmente formulado en base a Acetamiprid, que actúa por ingestión, para el control de BICHO BOLITA (*Armadillidium vulgare*) en cultivos de soja y otras leguminosas, girasol, maíz, trigo y colza, especialmente recomendado para situaciones de cultivos realizados bajo la modalidad de SIEMBRA DIRECTA.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Modo de aplicación: Se recomienda realizar la aplicación al voleo con esparcidoras centrífugas especialmente diseñadas para este uso, que permitan distribuir la dosis recomendada en forma pareja y uniforme en todo el lote. El momento de aplicación y la dosis a utilizar dependerán de los datos recolectados durante el monitoreo. Los mejores resultados se han obtenido con la aplicación previa a la siembra o al momento de realizar la misma, para lograr de esta forma un excelente control de la plaga antes de la germinación, lo que es considerado un punto crítico para el correcto establecimiento del cultivo y la obtención de la densidad adecuada de plantas en el lote.

Recomendaciones de uso:

Cultivos	Plaga	Dosis (kg/ha)	Momento de aplicación
Soja y otras leguminosas, girasol, maíz, trigo, colza	Bicho bolita (<i>Armadillidium vulgare</i>)	3-5 (*)	Previo a la siembra o al momento de realizar la misma

(*) Se recomienda el uso de las dosis mayores en caso de altas poblaciones de "bicho bolita", condiciones del lote y/o ambientales predisponentes, o toda otra situación que haga más agresiva la presencia de la plaga sobre el cultivo.

Para obtener los mejores resultados con Clartex X-TRA se recomienda efectuar el monitoreo de los lotes previo a la siembra para determinar la dosis correcta de producto y así lograr un adecuado control de Bichos Bolita (*Armadillidium vulgare*) y mantener el nivel de los mismos por debajo del umbral de daño económico.

Restricciones de uso:

Por sus recomendaciones de uso y aplicación posicionada, no presenta periodo de carencia.

Compatibilidad:

Por su especificidad, se recomienda su aplicación en forma independiente de cualquier otro producto fitosanitario o fertilizante.

Fitotoxicidad:

Por su aplicación posicionada, no directamente al follaje y antes de la emergencia del cultivo NO PRESENTA síntomas de fitotoxicidad.

Aviso de consulta técnica:

POR MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL USO DEL PRODUCTO, CONSULTE A LA EMPRESA.

LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRÓNOMO.

RIZOBACTER

DE SANGOSSE



CUIDADO

